

1. ¿Qué anomalía del pensamiento se caracteriza por quiebres entre el mundo externo y el interno, entre el yo y la conciencia de su contenido y dentro de la conciencia de ese mismo contenido?
A. Obsesivo
B. Delusional
C. Esquizofrénico
D. Demencial
E. Fuga de ideas
2. ¿Cuál de los siguientes trastornos presenta con más frecuencia síntomas como enlentecimiento psicomotor, hipoergía y desánimo, muy semejantes a un episodio depresivo?
A. Hipotiroidismo
B. Síndrome de Cushing
C. Hiperlipidemia
D. Diabetes mellitus
E. Panhipopituitarismo
3. ¿Cuál de los siguientes trastornos de personalidad está principalmente asociado a episodios conversivos producto de su extrema emocionabilidad y sugestionabilidad?
A. Dependiente
B. Evitativo
C. Narcisista
D. Histriónico
E. Obsesivo
4. Varón de 35 años, hace un año se hizo cirugía bariátrica por obesidad mórbida; no usa complementos nutricionales desde hace 10 meses. Con el curso del tiempo se torna triste, desmotivado, con dificultades cognitivas además de hiporexia, hipoergía, palidez de piel y mucosas. Hace dos meses se añade desesperanza e ideas pasivas de muerte. Luego de la evaluación médica se le indica un cambio de dieta con lo que mejora notoriamente. ¿Cuál es el trastorno más probable?
A. Trastorno de adaptación
B. Déficit vitamina D
C. Intoxicación por B1
D. Exceso vitamina E
E. Déficit vitamina B12
5. Varón de 20 años, presenta problemas graves de conducta y socialización desde los primeros años de colegio, como hostigar a compañeros y faltar el respeto a profesores, además de maltrato a animales sin sentir pena ni remordimiento. Desde la secundaria inició consumo eventual de marihuana, agresividad y hurto. Nunca reconoce sus faltas y señala que su familia quiere perjudicarlo inventando todo. ¿Qué trastorno presenta?
A. Dependencia a sustancias
B. Déficit de atención con hiperactividad
C. Conducta disocial
D. Antisocial de personalidad
E. Narcisista de personalidad
6. ¿Qué antipsicótico es el más relacionado a riesgo de agranulocitosis y convulsiones?
A. Clozapina
B. Olanzapina
C. Quetiapina
D. Risperidona
E. Clorpromazina
7. Niño de 8 años, descrito como "inquieto, hiperactivo, desobediente", que desde hace tres años presenta tics faciales que se acompañan de sonidos diversos, interrumpe clases con movimientos y exclamaciones. Desde hace dos años tiene frecuentes castigos por decir groserías, por lo que tiene matrícula condicional. Fuera de esto, es un niño amable y que se relaciona bien con sus compañeros y hermanitos. ¿Qué diagnóstico considera con más probabilidad?
A. Gilles de la Tourette
B. Hiperactividad
C. Déficit parental
D. Autismo
E. Personalidad disocial
8. Varón de 36 años, remitido por Dermatología. Muestra piel de las manos enrojecida, seca y descamada. Refiere que se lava con frecuencia las manos con productos de limpieza industrial para no llevar gérmenes a su casa, aunque reconoce: "estoy exagerando en mi cuidado, pero no lo puedo evitar". ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A. Fobia a la contaminación
B. Trastorno dismórfico corporal
C. Ansiedad generalizada
D. Trastorno obsesivo compulsivo
E. Parasitosis delirante

9. ¿Cómo se denomina a la crisis de sueño que empieza y termina de forma brusca, que puede acompañarse a veces de relajación muscular completa sin perder la conciencia de la realidad?
- A. Cataplexia
B. Catalepsia
C. Narcolepsia
D. Sonambulismo
E. Pesadilla
10. ¿Qué evaluaría necesaria e inmediatamente, en un paciente con antecedentes de depresión refractaria, diabético, sin parientes cercanos, que se presenta a un control de rutina y afirma que se ha retirado los antidepresivos y que ha legado sus bienes porque ya no los necesita y que nadie lo extrañará cuando parta de este mundo?
- A. Red de apoyo social
B. Riesgo de suicidio
C. Tasa de transporte de litio
D. Cambio de medicación
E. Mecanismos de defensa
11. ¿Qué tratamiento indicaría para un paciente agitado producto de la abstinencia al alcohol?
- A. Haloperidol y midazolam
B. Haloperidol y tiamina
C. Clorpromazina y diazepam
D. Diazepam y tiamina
E. Diazepam y glucosa
12. ¿En qué tipo de trastorno de la infancia es más frecuente la dificultad para dormir producto de temores a monstruos en la oscuridad?
- A. Depresivos
B. Obsesivos
C. Ansiosos
D. Eliminación
E. Psicóticos
13. ¿Cuál fue el primer fármaco aprobado para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo?
- A. Amitriptilina
B. Bupropion
C. Clomipramina
D. Venlafaxina
E. Fluoxetina
14. ¿Qué sustancia cuyo consumo produce ojos rojos y fatiga suele ser alucinógena a altas dosis?
- A. Cocaína
B. PBC
C. Alcohol
D. Marihuana
E. Inhalantes
15. ¿Cuál es considerado un factor de buen pronóstico en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad?
- A. Consumo de sustancias
B. Agresividad
C. Bajo rendimiento escolar
D. Problemas de conducta
E. Familia funcional
16. ¿A qué anomalía psicológica está asociada la imposibilidad de parar el consumo casi diario de marihuana en un adolescente, a pesar de ser conocedor de los perjuicios psicológicos, físicos, familiares y personales de hacerlo?
- A. Pensamiento
B. Voluntad
C. Sentimiento
D. Inteligencia
E. Conciencia
17. Varón de 45 años, que suele despedir a sus trabajadores por motivos mínimos sin importarle lo que esto significa para ellos y sus familias. Cuenta con el apoyo del gerente general con quien es el único que coordina sus acciones, pues piensa que el resto no está a su nivel. ¿Qué trastorno de personalidad está principalmente asociado a sus rasgos?
- A. Antisocial
B. Narcisista
C. Obsesivo
D. Histriónico
E. Esquizoide
18. ¿Cuál es el daño más grave asociado principalmente al consumo crónico y compulsivo de marihuana?
- A. Neurológico
B. Oftalmológico
C. Respiratorio
D. Cardíaco
E. Inmune

19. Mujer de 26 años, con diagnóstico de claustrofobia y que llega tarde a su trabajo por miedo a subir por el ascensor a su oficina en el piso 15. Aprende técnicas de relajación pero fracasa ante la exposición imaginal y teme hacer la exposición en vivo. ¿Qué alternativa terapéutica tiene pruebas de efectividad?
- A. Relajación en el sitio
B. Realidad virtual
C. Electroshock
D. Benzodiazepinas
E. Estimulación magnética
20. ¿Cuál es la región en donde se ha registrado un mayor porcentaje de trastorno de estrés postraumático en encuestas epidemiológicas?
- A. Lima
B. Madre de Dios
C. Ayacucho
D. San Martín
E. La Libertad
21. ¿Cuál es el fármaco que se asocia con mayor frecuencia a la aparición de síntomas psicóticos en el tratamiento de tuberculosis?
- A. Etambutol
B. Kanamicina
C. Cicloserina
D. Isoniazida
E. Pirazinamida
22. Niño de 6 años, que moja la cama 3 a 4 noches por semana. ¿Cuál es el tratamiento más recomendado?
- A. Hacer que lave su pijama
B. Usar hormona de crecimiento
C. Evaluación por urología
D. Medidas conductuales
E. Tratamiento aversivo
23. ¿Qué función debe ser la primera en evaluarse en un paciente con agitación psicomotriz que es traído a la emergencia?
- A. Pensamiento
B. Voluntad
C. Conciencia
D. Sentimiento
E. Percepción
24. Niño de 7 años, llora todas las mañanas al despertar y dice que está enfermo. Suele ir al tóxico quejándose de dolor abdominal o de cabeza y pidiendo que lo recoja su madre. El pediatra ha descartado que sus molestias sean por enfermedad física. Durante el fin de semana está libre de síntomas, salvo cuando eventualmente ambos padres salen y lo dejan al cuidado de la niñera. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Fobia escolar
B. Fobia social
C. Depresión mayor
D. Retraso mental
E. Ansiedad por separación
25. En un paciente agitado que llega a la emergencia. ¿Cuál de los siguientes hallazgos nos orienta a pensar más en causa neurológica?
- A. Inicio súbito previamente asintomático
B. Episodios previos similares
C. Alucinaciones auditivas
D. Amnesia reversible
E. Desorganización del pensamiento
26. Mujer de 37 años, con diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada en tratamiento; afirma que cuando se siente más tensa le pica el cuerpo. Su médico observa ronchas con halo blanco en esos periodos. ¿Cuál es la patología que se asocia con mayor probabilidad a ese diagnóstico?
- A. Psoriasis
B. Alergia a ISRS
C. Prurito
D. Urticaria adrenérgica
E. Píriasis
27. ¿Qué síntomas están principalmente relacionados a suicidio en esquizofrenia?
- A. Delusivos
B. Alucinatorios
C. Catatónicos
D. Obsesivos
E. Depresivos

28. Varón de 18 años, intenta suicidarse al descubrirse que desde hace un año gastaba cantidades cada vez mayores de dinero en apuestas. Al inicio ganaba, posteriormente tuvo pérdidas y empezó a deprimirse; para recuperar el dinero invertía varias horas y utilizaba las tarjetas de sus padres. Ha desaprobado el último ciclo de la universidad por el juego. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Personalidad antisocial
B. Ludopatía
C. Depresión mayor
- D. Bipolar I
E. Oposicionista desafiante
29. Mujer de 55 años, casada, contadora. Desde que recuerda tiene sensación de insatisfacción, inutilidad y vacío. Si bien siempre ha sido poco conversadora, seria y malhumorada; nunca ha presentado episodios donde se haya rendido a la tristeza o fatiga, siempre ha cumplido bien sus tareas en el trabajo y en la casa a pesar de sus continuas quejas de agotamiento. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Ansiedad generalizada
B. Personalidad obsesiva
C. Personalidad esquizoide
- D. Distimia
E. Fobia social
30. Niño de 8 años, con buen control de esfínteres previo, deja de ir al baño por periodos largos hasta que las heces salen por rebosamiento. Esto coincide con la llegada de un nuevo hermano, aunque este había sido deseado por el niño. ¿Cuál es la explicación más probable?
- A. Dolico colon
B. Conducta regresiva
C. Fobia a la defecación
- D. Fisura anal
E. Constipación
31. ¿Cuál de los siguientes pacientes tiene más riesgo de desarrollar delirio?
- A. Niño desnutrido
B. Joven con fractura
C. Anciano polimedicado
- D. Mujer en cesárea
E. Consumidor de coca
32. ¿Qué función psicológica está gravemente comprometida en las personas que se suicidan?
- A. Conciencia del yo
B. Tendencias instintivas
C. Voluntad
- D. Sentimiento
E. Pensamiento
33. Mujer de 25 años, presenta durante algunas semanas delusiones de daño y alucinaciones auditivas; se le inicia 5 mg/d de olanzapina con lo cual recupera su funcionalidad y desaparecen síntomas. Luego de cuatro meses de tratamiento pide que le retiren la medicina pues teme subir de peso. ¿Cuál es la medida más adecuada?
- A. Subir a 10 mg/d y mantener por 2 años
B. Retirar la medicina y darle de alta
C. Bajar a 2.5 mg/d luego retirar y observar
- D. Iniciar antipsicótico de depósito
E. Cambiar a aripirazol 15 mg/d y reevaluar
34. Mujer de 40 años, expresa en terapia que su esposo no se amolda a su forma de ser porque como llega tarde del trabajo, no colabora con la limpieza de la casa para que esta se mantenga impecable. Cuando él le ofrece contratar a alguien para que los ayude, ella lo considera una ofensa pues en su familia eso nunca fue necesario, ya que su padre siempre ayudó en todo. ¿Qué trastorno de personalidad presenta?
- A. Narcisista
B. Dependiente
C. Antisocial
- D. Histriónico
E. Obsesivo
35. Mujer de 24 años, presenta cefalea intensa y fatiga el día posterior a ser sometida a una apendicectomía y continúa en NPO. Sus signos vitales permanecen estables. ¿Por la carencia de qué sustancia, se explica esta molestia?
- A. Cocaína
B. Marihuana
C. Alcohol
- D. Benzodiazepina
E. Cafeína

36. Varón de 65 años, traído hipotenso a la emergencia tras realizarse un corte profundo en el cuello con intención suicida. Seis meses antes su esposa se va de la casa cansada de su temperamento impulsivo y agresivo por lo que se queda solo. Desde esa fecha está muy deprimido y con planes de suicidio cada vez más sólidos. Al examen aparentemente tranquilo pero rechaza responder a la entrevista. ¿Cuál es la medida inmediata más apropiada?
- A. Sedación con benzodicepinas
B. Sujeción mecánica
C. Hospitalización supervisada
D. Alta con soporte familiar
E. Psicoterapia de apoyo
37. ¿Cuál de las siguientes plantas medicinales de consumo habitual para el control de la ansiedad (sin receta médica) debe evitarse en pacientes hipertensos, diabéticos o con cáncer de mama?
- A. Valeriana
B. Manzanilla
C. Gingko
D. Hipérico
E. Ginseng
38. ¿Cuál de los siguientes es un efecto colateral esperado en el tratamiento con metilfenidato del trastorno de déficit de atención con hiperactividad?
- A. Hipersomnia
B. Cefalea
C. Hiperfagia
D. Hipotensión
E. Bradicardia
39. ¿Qué trastorno se debe considerar en pacientes con síntomas afectivos, que en el pasado han tenido delusiones o alucinaciones por al menos dos semanas, sin tener síntomas maníacos o depresivos?
- A. Bipolar II
B. Psicótico breve
C. Esquizoafectivo
D. Límite
E. Disociativo
40. ¿Cuál de las siguientes sustancias que son utilizadas para calmar la ansiedad, el insomnio o la abstinencia a otras, pero con el tiempo terminan generando dependencia?
- A. Alcohol
B. Nicotina
C. Opiáceos
D. Marihuana
E. Benzodicepinas
41. ¿Qué tipo de síndrome se caracteriza por retardo mental, hipotónia neonatal, hipogonadismo, hiperfagia y altos niveles de grelina?
- A. Kleine-Levin
B. Prader-Willi
C. Trisomía 21
D. Turner
E. Desintegrativo
42. ¿Qué medida puede tomarse en la emergencia, con un paciente extremadamente agresivo si es que no se calma y se sospecha de traumatismo encefalocraneano?
- A. Haloperidol 5 mg EV c/12 hs
B. Haloperidol 10 mg EV c/30 min
C. Diazepam 10 mg EV c/6 hs
D. Midazolam 15 mg IM c/8 hs
E. Sujeción mecánica
43. La demencia de Korsakoff es una consecuencia irreversible del alcoholismo crónico y se relaciona con la deficiencia de ...
- A. niacina.
B. tiamina.
C. rivotravina.
D. cianocobalamina.
E. piridoxina.
44. De los siguientes mecanismos de defensa en la adaptación a la enfermedad crónica. ¿Cuál es de nivel inmaduro?
- A. Sublimación
B. Control
C. Idealización
D. Racionalización
E. Humor

45. Autismo, ambivalencia, (trastorno del) afecto y (trastorno de la) asociación son conocidas como las 4A de ...
A. Kretschmer. D. Jung.
B. Meyer. E. Adler.
C. Bleuler.
46. ¿Qué trastorno de personalidad está caracterizado por lo extraño de su conducta y pensamiento, además de estar muy asociado a la esquizofrenia?
A. **Esquizotípico** D. Antisocial
B. Paranoide E. Límite
C. Esquizoide
47. Se evalúa el coeficiente intelectual de un niño de 6 años, proveniente de una reserva asháninka, que inició hace tres meses su escolaridad en una ciudad pequeña y muestra problemas de aprendizaje. El resultado es CI de 68. La familia insiste en que es muy despierto y aprende con facilidad en casa, aunque a veces hay que hablarle en voz alta, y que se siente contento en el colegio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A. Retardo mental moderado D. Trastorno adaptativo
B. Retardo mental leve E. Trastorno de atención
C. Hipoacusia
48. Varón de 60 años, con diagnóstico de meningioma temporal, acude a emergencia somnoliento, desorientado y con problemas de memoria. Presenta episodios de incontinencia de risa y llanto, además de pensamiento delusional. Con el curso de los días recupera su estado de conciencia y emocional, pero persisten las delusiones. ¿Qué trastorno presenta?
A. Demencia de Alzheimer **D. Psicosis por meningioma**
B. Delirio por meningioma E. Depresión con síntomas psicóticos
C. Manía con síntomas psicóticos
49. Varón de 30 años, desde muy niño se sintió totalmente identificado con el sexo femenino y deseaba ser mujer. Al cumplir la mayoría de edad viaja al extranjero donde inicia un proceso psicoterapéutico y tratamiento endocrinológico para cambio de género. Con el curso de los años logra con enorme satisfacción el cambio deseado; al lucir como mujer cambia su voz, su apariencia física, gestos, su forma de actuar, sentir, pensar y hasta muchos valores previos. ¿Qué fenómeno de la conciencia del yo predomina?
A. Despersonalización **D. Conciencia de transformación de la personalidad**
B. Falta de distinción del yo E. Personalidades múltiples o alternantes
C. Desdoblamiento del yo
50. ¿Cuál de los síntomas del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, suele ser el primero en remitir en la adolescencia y la adultez?
A. **Hiperactividad** D. Intolerancia
B. Impulsividad E. Irritabilidad
C. Distrabilidad
51. Varón de 40 años, con tumoración abdominal. Realiza casi todos los exámenes preoperatorios, pero huye de Radiología antes de ingresar al ambiente de resonancia magnética. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A. **Claustrofobia** D. Ailurofobia
B. Agorafobia E. Gnosofobia
C. Nictofobia
52. ¿Cuál de las siguientes sustancias, frecuente en bebidas energizantes, puede desencadenar con mayor probabilidad episodios similares a crisis de pánico?
A. Terfenadina **D. Cafeína**
B. Teobromina E. Sodio
C. Taurina

53. Soltero de 44 años, oficinista, trabajador, callado y poco sociable, detenido por intento de ingreso al camerino de una célebre cantante. Sujeto afirma que ella lo ama desde hace 10 años y se le declaró a través de canciones y fotos en periódicos, pero debe ocultar su cariño por seguridad de ambos, porque hay gente que los persigue. Afirma que quiso entrar al camerino para saludarla y decirle que no traicionará su secreto. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Delusional celotípico
B. Delusional erotomaniaco
C. Esquizofrenia paranoide
D. Obsesivo compulsivo
E. Fijación patológica
54. ¿Quién describió los síntomas de primer rango en la esquizofrenia?
- A. Sigmund Freud
B. Konrad Lorenz
C. Kurt Schneider
D. Emil Kraepelin
E. Adolf Meyer
55. En un paciente maniaco. ¿Con qué patología comórbida es preferible evitar la administración de litio?
- A. Lupus eritematoso sistémico
B. Desorden vascular cerebral
C. Gastritis antral
D. Distrofia muscular
E. Dermatitis actínica
56. Varón de 72 años, abogado, calificado como desconfiado y celoso por la familia; desde hace un año se queja de ser espiado por sus familiares porque quieren robarle su dinero. La esposa refiere que sigue atendiendo su estudio sin problemas, pero que desde hace 6 meses olvida recoger el vuelto cuando compra. El examen físico y exámenes auxiliares no son contributivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Demencia de Alzheimer
B. Trastorno delusional
C. Manía de inicio tardío
D. Trastorno obsesivo
E. Intoxicación por plomo
57. Médica pediatra de 30 años, llega a la emergencia tras haber ingerido 10 tabletas de clonazepam 0.5 mg y una botella de vino, con la intención de quitarse la vida, una semana después del fallecimiento de su madre. ¿Cuál es el mejor indicador de la valoración del riesgo suicida en este caso?
- A. Sexo femenino
B. Depresión mayor
C. Método letal
D. Intento previo
E. Riesgo profesional
58. Mujer de 26 años con tres gestaciones previas (dos de ellas fueron partos prematuros), en 7º mes de gestación, manifiesta felicidad por su gestación, solo tuvo un control prenatal, ella menciona "porque no tengo tiempo y mi esposo no tenía plata". Examen: triste, equimosis en piernas, abdomen y brazos. Sobre el esposo, dice "es bueno" y evade otras preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Esquizofrenia
B. Retardo mental
C. Depresión gestacional
D. Personalidad paranoide
E. Abuso conyugal
59. Deportista calificado que cursa con síntomas depresivos. Consume una sustancia con fines estimulantes que mejoraba rápidamente su estado de ánimo, la sensación de lucidez y energía, provocando un mayor rendimiento en sus actividades. Sin embargo, la sustancia genera dependencia, pues al pasar el corto efecto de esta aparecían síntomas depresivos que empeoran el estado previo. ¿Qué sustancia consume?
- A. Marihuana
B. Cafeína
C. Cocaína
D. Benzodiazepina
E. Antidepresivo
60. ¿Qué trastorno de la personalidad puede diagnosticarse por error en personas con temperamento tímido, si es que no se evalúa correctamente la severidad e impacto de los rasgos en su vida?
- A. Dependiente
B. Antisocial
C. Esquizoide
D. Evitativo
E. Esquizotípico

61. ¿A qué trastorno de la personalidad pueden ser más susceptibles las personas que han presentado enfermedades físicas crónicas durante la niñez?
- A. Evitativo
B. Obsesivo
C. Límitrofe
- D. Dependiente
E. Histriónico
62. ¿Qué función mental se encuentra principalmente comprometida en personas con buena memoria para reproducir mecánicamente lo aprendido, expresándolo como si fueran ideas propias que intentan lucir aunque al examen profundo se evidencia la incapacidad para juzgar con criterio propio y comprender lo que expresan?
- A. Pensamiento
B. Inteligencia
C. Voluntad
- D. Conciencia
E. Conciencia del yo
63. ¿Qué anomalía de la conciencia es difícil de identificar pues la persona se desenvuelve con aparente coherencia, sin embargo puede cometer excesos conductuales producto de su desconexión con el entorno?
- A. Estado onírico
B. Embriaguez
C. Delirio
- D. Estado crepuscular
E. Confusión mental
64. Varón de 26 años, debuta con alucinaciones auditivas poco estructuradas por un mes; luego gradualmente aislamiento social, deterioro del aseo y abandono del trabajo. Evita realizar actividades caseras; persiste en esta conducta durante una hospitalización. Examen físico, laboratorio e imágenes no son contributivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Trastorno desintegrativo
B. Personalidad disocial
C. Hipotiroidismo
- D. Esquizofrenia simple
E. Demencia precoz
65. ¿Qué vía de administración de cocaína, tiene una lenta velocidad de aparición de sus efectos y casi nula posibilidad de generar dependencia, pero puede encontrarse el metabolito benzoilecgonina hasta cuatro días después del último consumo?
- A. Clorhidrato intranasal
B. Clorhidrato endovenoso
C. Infusión de hojas de coca
- D. Pasta básica
E. Crack
66. ¿Cuál es la idea obsesiva más frecuente?
- A. Perversión
B. Comprobación
C. Repetición
- D. Contaminación
E. Orden
67. Ama de casa de 49 años, presenta fatiga, insomnio de conciliación y tensión muscular. Desde hace 4 años está "en constante alarma, por todas las cosas malas que se escuchan a diario" y ocasionalmente palpitaciones, tensión muscular y sensación de falta de aire. Hace sus labores aprisa, "porque el tiempo me gana". Llama constantemente a sus hijas y esposo por teléfono, se asusta si no le contestan o llegan tarde, si estornudan o manifiestan molestias físicas; teme que tengan una enfermedad grave. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Ansiedad generalizada
B. Pánico
C. Catastrofización
- D. Obsesivo compulsivo
E. Dependencia
68. Médico de muy buen desempeño en el laboratorio; rechaza el puesto de jefatura argumentando que prefiere seguir trabajando solo, pues así se desempeña mejor y evita dificultades con otras personas. Nunca le interesó socializar y es emocionalmente frío. ¿Qué trastorno de personalidad presenta?
- A. Esquizoide
B. Narcisista
C. Obsesivo
- D. Esquizotípico
E. Evitativo
69. El mecanismo más frecuente de adquisición de una fobia es el condicionamiento ...
- A. exponencial.
B. repetitivo.
C. operante.
- D. clásico.
E. vicario.

70. ¿Qué medicamento se ha probado como útil en el tratamiento del déficit de atención con hiperactividad en niños asmáticos, los que no suelen tolerar los estimulantes?
- A. Amitriptilina
B. Haloperidol
C. Venlafaxina
D. Bupropión
E. Valproato
71. Mujer de 58 años, que desde hace cuatro meses presenta síntomas depresivos, ansiedad, insomnio, ideación y plan suicida expresado pero cuestionado; vive con su esposo, quien la acompaña la mayor parte del día y la describe como una persona tranquila y dócil. ¿Cuál sería la medida terapéutica más recomendable?
- A. Contrato de no suicidio y alta
B. Farmacoterapia oral y vigilancia en casa
C. Farmacoterapia oral y hospitalización prolongada
D. Farmacoterapia parenteral y hospitalización breve
E. Psicoterapia de apoyo y hospitalización prolongada
72. La deprimida esposa de Martín, 63 años, empresario exitoso y con un alto cargo público, es acusada por éste de meter a sus amantes en su departamento, por lo que en la noche M. cierra la puerta del departamento con llave y también la puerta de su cuarto, tras de lo cual la esposa se acuesta y M pasa la noche apoyado en la puerta del cuarto, "para que ella no se aproveche de mi sueño y haga entrar a sus amantes". ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Esquizofrenia paranoide
B. Trastorno delusional celotípico
C. Manía persecutoria
D. Trastorno obsesivo compulsivo
E. Síndrome de Capgras
73. Mujer de 20 años, traída a emergencia muy inquieta. Antes del examen de admisión se torna muy ansiosa y presenta disnea, taquicardia, mareos y temblores. Al momento que le entregan el cuadernillo, los síntomas se intensifican. Ya van tres veces que le sucede lo mismo sólo cuando postula. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Fobia social
B. Pánico
C. Fobia específica
D. Ansiedad generalizada
E. Conversivo
74. Mujer de 44 años, casada, con dos hijos adolescentes; luego de saber que tiene un carcinoma de mama metastásico, pasa por periodos de cólera y tristeza que se resuelven. En una consulta, confiesa al psiquiatra que está más tranquila desde que le ha pedido a Dios vivir hasta que su hija menor entre a la universidad. "Luego, él puede hacer lo que quiera". ¿Cómo se llama esa etapa del duelo?
- A. Adaptación
B. Negación
C. Fijación
D. Negociación
E. Resignación
75. Niño de siete años, con grandes dificultades para atender en el colegio, molesta a compañeros y le es muy difícil mantenerse sentado. Termina rápido sus deberes pues es hábil y está muy pendiente del recreo, donde corre sin parar y sin tener cuidado de no empujar a sus compañeros. En casa y en otros ambientes su conducta es similar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Opositorista desafiante
B. Ansiedad de separación
C. Déficit de atención con hiperactividad
D. Bipolar
E. Depresión mayor
76. De los siguientes trastornos adictivos. ¿Cuál es el que asocia principalmente en comorbilidad con la ludopatía?
- A. Alcohol
B. Marihuana
C. Cocaína
D. Benzodiazepinas
E. Nicotina
77. ¿Qué sustancia está más relacionada a dependencia en pacientes con esquizofrenia?
- A. Alcohol
B. Nicotina
C. Marihuana
D. Cocaína
E. Anfetaminas

78. ¿Qué porcentaje de personas que intentan suicidarse, posteriormente llegan a consumir suicidio?
A. 1
B. 30
C. 50
D. 70
E. 10
79. ¿Cuál es la tasa de concordancia de la esquizofrenia en estudios de gemelos?
A. 10
B. 0.5
C. 92
D. 50
E. 27
80. La medicación antipsicótica eleva el riesgo de algunos trastornos y enfermedades médicas no psiquiátricas. ¿Cuáles son las más frecuentes?
A. Obesidad y diabetes
B. Miocardiopatía y asma
C. Lupus y dislipidemia
D. Hipotiroidismo y arritmia
E. Hipertensión y anemia
81. El diagnóstico de encopresis se puede hacer a partir de los ... años.
A. 11
B. 4
C. 2
D. 6
E. 8
82. ¿Qué anomalía del sentimiento se caracteriza por la incapacidad innata para experimentar sentimientos superiores como el amor, la pena, la compasión y la lealtad, en personas de buen intelecto que fingen que los tienen?
A. Estupor emocional
B. Apatía
C. Sentimiento de anafectividad
D. Espontaneidad afectiva anormal
E. Estupidez afectiva
83. ¿Cuál de los siguientes tipos de cáncer es el que suele manifestarse inicialmente como un trastorno depresivo?
A. Pancreático
B. Tiroideo
C. Células en avena
D. Ovárico
E. Prostático
84. En la inanición por anorexia nerviosa. ¿Cuál es la alteración responsable de producir hipotermia, hipotensión, bradicardia y depresión?
A. Hipoactividad noradrenérgica
B. Elevación de tiroxina (T4)
C. Descenso del cortisol
D. Incremento estrogénico
E. Ácido úrico sérico bajo
85. ¿Cuál es el estabilizador del ánimo que se asocia más frecuentemente con incremento de peso y caída de cabello?
A. Oxcarbazepina
B. Mirtazapina
C. Lamotrigina
D. Ácido valproico
E. Topiramato
86. Mujer de 30 años, tiene un accidente donde sale ilesa pero fallece su esposo. Durante una semana no recordaba el accidente y tampoco que estaba casada; posteriormente lo hizo entrando en una gran crisis emocional. ¿Qué tipo de amnesia presentó?
A. Retrógrada
B. Irreversible
C. Psicógena
D. Progresiva
E. Anterógrada
87. Varón alcohólico crónico de 50 años, acude a la emergencia con compromiso del sensorio y aliento alcohólico. Examen y estudio de imágenes sin evidencia de hallazgos neurológicos. A los dos días despierta confuso, inquieto, diaforético y temeroso con FC: 100 X' y PA: 180/95 mmHg. A la entrevista luce desorientado y dice que ve insectos caminando en la pared. ¿Cuál es el cuadro más probable asociado al alcohol?
A. Alucinosis
B. Intoxicación aguda
C. Encefalopatía de Wernicke
D. Abstinencia
E. Abuso

88. ¿Cuál de los siguientes trastornos de la personalidad suele presentar dificultades de pareja y relaciones laborales, aún con el curso de los años, debido a su desconfianza e interpretaciones negativas de los actos ajenos?
- A. Esquizoide
B. Antisocial
C. Evitativo
D. Esquizotípico
E. Paranoide
89. ¿Cuál es el principal trastorno de la personalidad asociado a suicidio?
- A. Límite
B. Antisocial
C. Dependiente
D. Histriónico
E. Obsesivo
90. ¿Qué mecanismo de defensa adaptativo tienen los pacientes con diagnóstico de enfermedad terminal, que planifican su vida futura en previsión de posteriores sucesos desagradables?
- A. Sublimación
B. Proyección
C. Escisión
D. Anticipación
E. Devaluación
91. Varón de 32 años, ingresa a emergencia gritando que se asfixia y va a morir. Examen: piel y mucosas rosadas, sudoración, temblor discreto y piloerección, resto del examen no contributivo. PA: 119/70 mmHg, FC: 101X', FR: 25X'. EKG sin alteraciones. Sat O2 y resto de exámenes dentro de parámetros normales. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Fobia
B. Pánico
C. Psicosis
D. Distimia
E. Disociación
92. Niña de 3 años, desarrollo normal hasta el año y medio de edad, donde pierde los avances del habla y presenta ataxia, gesticulación facial, deterioro de habilidades motoras, movimientos estereotipados en manos y episodios matutinos de hiperventilación al despertar. Convulsiones desde los dos años y medio. Morfológicamente sin alteraciones y sin cambios de color de piel, ni trastornos metabólicos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Enfermedad de Tay Sachs
B. Neurofibromatosis
C. Cromosoma X frágil
D. Síndrome de Rett
E. Toxoplasmosis
93. Varón de 35 años sin antecedentes policiales es retenido en una comisaría porque ingresó a un banco exigiendo que le abran la bóveda para sacar su dinero, alegando que era el dueño. Afirma que no pueden retenerlo porque es amigo del presidente y él lo sacará; habla y se mueve con rapidez, se muestra muy inquieto, pelea con un policía y minutos después hace bromas y ríe con todos, ofreciéndoles un banquete. Niega enfermedades. No hay evidencia de consumo de sustancias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Episodio maniaco
B. Personalidad límite
C. Trastorno disociativo
D. Personalidad antisocial
E. Episodio psicótico breve
94. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene la mayor probabilidad de inducir la aparición de un episodio maniaco o hipomaniaco?
- A. Agomelatina
B. Valproato
C. Paroxetina
D. Carbamazepina
E. Zolpidem
95. Niña de 7 años, con buen control esfinteriano previo, que inicia enuresis y fiebre. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Abuso sexual
B. Infección del tracto urinario
C. Trastorno de adaptación
D. Traumatismo uretral
E. Parasitosis vaginal

96. Mujer de 18 años, desde hace 24 horas luce hipersomnolienta, responde pobremente a estímulos verbales, con respuestas pobres y no relacionadas a las preguntas; impresiona desorientada, por momentos se torna muy intranquila y dice que escucha a personas que la insultan y la quieren atacar. ¿Qué función mental está principalmente comprometida?
- A. **Conciencia** D. Sentimiento
B. Pensamiento E. Voluntad
C. Percepción
97. ¿Qué medida no farmacológica, puede emplear un sujeto para manejar discretamente sus molestias en medio de un ataque de pánico, ante la imposibilidad de salir de una reunión en su oficina?
- A. Técnicas de imaginería **D. Respiración diafragmática**
B. Respirar en bolsa de papel E. Uso de té relajante
C. Biorretroalimentación
98. ¿Qué anomalía presenta un paciente que se queja de dolor de pecho cada vez que siente los dedos del que le toma el pulso?
- A. Sinestesia **D. Sensaciones simultáneas**
B. Extrañeza de lo percibido E. Ilusión
C. Alucinación
99. Adolescente mujer de 15 años, residente en Lima, con antecedentes de abuso sexual por el padrasto quien huyó de casa, llama desesperada a su madre desde una comisaría de Huacho; no sabe cómo llegó allí. La madre la encuentra confusa, perpleja, repitiendo que ha visto al padrasto merodear por su casa, lo que fue confirmado por una vecina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. **Fuga disociativa** D. Histrionismo
B. Psicosis breve E. Simulación
C. Amnesia psicógena
100. En los niños con retardo mental. ¿Qué tipo de déficit se asocia con mayor frecuencia a episodios de violencia?
- A. **Comunicación** D. Reposo
B. Audición E. Nutricional
C. Inhibición