

1. Varón de 15 años, estudiante de secundaria, ha subido 20 kilos en un año; tuvo episodios semanales de una o dos horas de duración con ingestión voraz de alimentos sin hambre, a escondidas, con sensación de falta de control, hasta sentirse desagradablemente lleno. Esto le causó malestar emocional. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Anorexia nervosa  
B. Facticio  
C. Obesidad  
D. Depresión  
E. De atracones
2. ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene las cuatro A de Eugen Bleuler?
- A. Asociación, ansiedad, ambivalencia y alogia  
B. Alogia, anhedonia, apatía y afectividad  
C. Asociación, afectividad, autismo y ambivalencia  
D. Autismo, abreacción, angustia y anhedonia  
E. Abuso, apatía, abstinencia y ambivalencia
3. Julia de 33 años, secretaria de un estudio jurídico, soltera, muy retraída, es enviada a consulta por agredir a un abogado cuando este negó que estuviera enamorada de ella. Muy llorosa, expresó: "... X me ha mandado mensajes de amor desde hace 4 meses en cada escrito que me llegaba al escritorio, con sus miradas y su voz al darme órdenes... entiendo que el doctor tenía que disimular; la gente es chismosa... nadie más que yo lo sabía". El abogado no trabaja en la misma área y sólo le da órdenes para coordinaciones con sus asistentes. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Psicosis aguda  
B. Celotipia  
C. Catatonía  
D. Erotomanía  
E. Grandiosidad
4. Gianinna de 45 años, profesional medianamente competente, afirma: "soy una profesional A1, perfecta". Piensa que sus compañeros y jefe son injustos porque no recibe los mismos elogios y premios que una colega suya, apreciada por su capacidad, conocimientos y buen trato. Si le hablan bien de su colega, se incomoda y la critica. Cuando las técnicas no complacen sus pedidos, grita que no quiere estar en un servicio mediocre. Para conseguir permisos o hacer gestiones adopta una actitud seductora, enojándose si no los obtiene. Habla constantemente de sus importantes amigos y su maravilloso matrimonio, aunque está divorciada y tiene compromisos ocasionales. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Bipolar fase maníaca  
B. Personalidad histriónica  
C. Pseudología fantástica  
D. Complejo de inferioridad  
E. Personalidad narcisista
5. Mujer de 87 años, usuaria de aspirina, con diagnóstico de demencia vascular. Los familiares consultan si pueden darle *Gingko biloba* para mejorar su memoria porque es una "medicación natural y sin efectos adversos". ¿Cuál es el riesgo principal de dicho preparado?
- A. Arritmia  
B. Sangrado  
C. Somnolencia  
D. Irritabilidad  
E. Ataraxia
6. En el modelo de inflamación y enfermedad, los pacientes con trastornos depresivos muestran alteraciones en su inmunidad. ¿Cuál de los siguientes hallazgos se encuentra en dichos pacientes?
- A. Disminución de la interleukina 6 y 1b  
B. Aumento de la actividad del linfocito natural killer  
C. Aumento en la actividad de las plaquetas  
D. Aumento en la expresión de las proteínas de fase aguda  
E. Disminución de las moléculas de adhesión
7. ¿Cuál es el antidepresivo que cuenta con autorización para uso en dolor neuropático asociado a diabetes?
- A. Venlafaxina  
B. Fluoxetina  
C. Duloxetina  
D. Clonazepam  
E. Moclobemida
8. En un paciente deprimido e hipertenso. ¿Cuál es el antidepresivo por el que se debe monitorear con más cuidado la presión arterial y los hallazgos del electrocardiograma?
- A. Fluoxetina  
B. Duloxetina  
C. Amitriptilina  
D. Venlafaxina  
E. Mirtazapina

9. Mujer de 78 años, diabética, ama de casa (muy competente y activa, sociable y aficionada a la lectura) que es llevada a emergencia por sus hijos porque desde hace dos días cursa con desorientación en tiempo, cambios súbitos de ánimo, distractibilidad, olvido de medicamentos y agitación por las noches. El estado de la consciencia es fluctuante. Examen: piel y mucosas secas, resto no contributivo. Glicemia: 380mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico psiquiátrico más probable?
- A. Disestesia  
B. Delirium  
C. Disociación  
D. Depresión  
E. Demencia
10. Niña de 9 años que desde 3 meses antes de la evaluación experimentó ansiedad y desesperación ante imágenes mentales de cuchillos y navajas que intenta ignorar o suprimir sin éxito. El malestar empeoró hace dos meses; para aliviar la angustia, golpea la pared y una mesa. Si le impiden hacerlo, se angustia y llora hasta realizar la conducta. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. De ansiedad social  
B. Esquizofrenia  
C. Autismo  
D. Obsesivo compulsivo  
E. Disociativo
11. ¿Qué fármaco se usa para tratar el temblor inducido por litio, con mínimo riesgo de elevar ligeramente su concentración?
- A. Propranolol  
B. Biperideno  
C. Pancuronio  
D. Tirosina  
E. Clonazepam
12. Luis es asaltado a la salida de su trabajo y recuerda que sintió mucho miedo a ser herido o asesinado. ¿Cuál de las siguientes estructuras cerebrales está más relacionada con la emoción que sintió?
- A. Corteza prefrontal  
B. Núcleo accumbens  
C. Amígdala  
D. Hipotálamo  
E. Giro cingulado
13. Según Jean Piaget. ¿En qué estadio del desarrollo hay uso limitado del pensamiento lógico, capacidad de seguir las reglas y comprensión del significado de los valores?
- A. Operaciones formales  
B. Operaciones concretas  
C. Sensorio motor  
D. Preoperacional  
E. Concreto motor
14. Elizabeth Kubler-Ross describió por primera vez las etapas del duelo. ¿Cuál corresponde a la primera etapa?
- A. Arrepentimiento  
B. Ira  
C. Aceptación  
D. Disipación  
E. Negación
15. Persona con esquizofrenia, vendedor ambulante, que se quejó de escozor y dolor cutáneo desde que usó un antipsicótico. Este malestar mejoró discretamente luego de usar un protector solar indicado por dermatología. ¿Cuál es la conducta a seguir?
- A. Reducir el antipsicótico  
B. Educar al paciente  
C. Usar antipsicóticos de depósito  
D. Revisar la terapéutica  
E. Derivar a Medicina Interna
16. Varón de 36 años, en evolución favorable de episodio depresivo, sin otra patología; 10 días antes de su control presentó insomnio y edema. En el control con psiquiatría, el paciente confesó que 15 días antes tomó productos "naturales" para mejorar su ánimo, defensas y energías, los que juzgó inofensivos "porque vienen de plantas". ¿Cuál es la planta con mayor probabilidad de causar estas molestias?
- A. Lúpulo  
B. Melisa  
C. Ginseng  
D. Valeriana  
E. Manzanilla

17. Mujer de 27 años, víctima de un accidente de tránsito hace 1 año, con ingreso a unidad de cuidados intensivos por 7 días, donde estuvo al lado de otras pacientes que fallecieron; ella temía por su vida. Ingresó a terapia cognitivo conductual luego de 8 meses del alta. En la evaluación manifestó: "estoy incómoda... me siento congelada emocionalmente, como si no tuviera sentimientos o estuviera insensible a lo que antes me emocionaba o me entusiasmaba". ¿Cuál es el síntoma referido?
- A. Desapego emocional  
B. Evitación emocional  
C. Rememoraciones  
D. Abreacción  
E. Indiferencia
18. De los siguientes problemas detectados antes de una cirugía. ¿Cuál tiene mayor posibilidad de incrementar la morbimortalidad quirúrgica?
- A. Tratamiento por ansiedad  
B. Fobia a las operaciones  
C. Pánico y agorafobia  
D. Negación de depresión  
E. Transferencia hostil
19. ¿Cuál es el neurotransmisor que con más frecuencia se asocia a los síntomas crónicos de los trastornos de ansiedad?
- A. Histamina  
B. Dopamina  
C. Glutamato  
D. Serotonina  
E. Noradrenalina
20. ¿Cuál es el lapso de inicio de los síntomas de la depresión posparto?
- A. 3 a 5 días  
B. 3 a 6 meses  
C. 4 a 6 semanas  
D. 8 a 10 meses  
E. 20 a 30 días
21. Mujer de 67 años, cuya evaluación reciente en geriatría no mostró alteraciones, se quejó de olvidos desde hace dos meses, con extravíos de llaves u otros objetos pequeños o dificultades al recordar datos oídos recientemente. Tuvo un puntaje de 28 en el Minimental Test de Folstein, equivocándose en el día y el piso donde se encontraba el consultorio. Luego de la evaluación, se concluyó que el diagnóstico más probable es pseudodemencia. ¿Cuál es la característica clínica que permitió pensar en este cuadro?
- A. Disminución de la atención y concentración  
B. Tiempo prolongado de la deficiencia  
C. La queja detallada sobre el problema cognitivo  
D. Pérdida de objetos de uso cotidiano  
E. Orientación en fecha y piso de evaluación
22. ¿Qué preparado herbal sedante e hipnótico puede producir trastornos cognitivos y motores, molestias digestivas, hepatotoxicidad e insomnio?
- A. Valeriana  
B. Pasiflora  
C. Kava  
D. Hipérico  
E. Belladona
23. Un paciente alcohólico que dejó de beber licor, acudió a emergencia por temblor, ansiedad y agitación moderada. ¿Qué medicamento puede ayudarlo mejor?
- A. Clorazepato  
B. Quetiapina  
C. Diazepam  
D. Mirtazapina  
E. Propranolol
24. Si se quiere reemplazar un inhibidor de la monoaminoxidasa (IMAO) por clomipramina. ¿Cuántos días debe transcurrir entre la suspensión del IMAO y la administración del nuevo fármaco?
- A. 3  
B. 5  
C. 28  
D. 9  
E. 14
25. ¿Cuál es el mejor predictor de la capacidad del paciente esquizofrénico de manejar su propia medicación?
- A. Manejo emocional  
B. Función cognitiva  
C. Tipo de esquizofrenia  
D. Apoyo familiar  
E. Problemas motores

26. ¿Cuál de las siguientes patologías es el diagnóstico diferencial más frecuente del trastorno de pánico?
- A. Hipoglicemia
  - B. Hipertirodismo**
  - C. Enfermedad de Addison
  - D. Crisis de asma
  - E. Pancreatitis
27. ¿Qué tipo de epilepsia tiene mayor comorbilidad con las psicosis de tipo esquizofrénico?
- A. Ausencia
  - B. Mioclónica
  - C. Tónica clónica
  - D. Espasmo infantil
  - E. Parcial compleja**
28. Mujer de 38 años, que acudió en repetidas ocasiones a los servicios de emergencia. En la última evaluación se quejó de angustia extrema, palpitaciones, sensación de asfixia, miedo a morir, temblor y rubor. Al interrogatorio refirió que ha disminuido 4 kg de peso en tres meses y que tuvo diarreas frecuentes. Examen: FR: 35X', FC: 124X' y T°: 37.2 °C. Resto no contributorio. ¿Qué examen auxiliar solicitará el psiquiatra con mayor probabilidad?
- A. Dosaje de B12
  - B. Calcitonina
  - C. Tomografía craneal
  - D. T3, T4 y TSH**
  - E. Transaminasas
29. ¿A partir de qué nivel de alcoholemia se afecta el juicio y dominio de sí mismo? ... %
- A. 0,05**
  - B. 0,10
  - C. 0,21
  - D. 0,17
  - E. 0,45
30. ¿Cuál es un factor de mal pronóstico en esquizofrenia?
- A. Signos neurológicos**
  - B. Estar casado
  - C. Tener trabajo
  - D. Suceso desencadenante
  - E. Inicio tardío
31. ¿Cuál de las siguientes condiciones tiene mayor probabilidad de agravar un episodio de depresión, incluso hasta la ideación suicida?
- A. Dolor crónico**
  - B. Diabetes
  - C. Olvidos benignos
  - D. Infecciones
  - E. Hiposmia
32. ¿Entre qué valores se sitúa el coeficiente intelectual (CI) en la discapacidad mental moderada?
- A. 35 y 50**
  - B. 51 y 70
  - C. 20 y 34
  - D. 19 y 10
  - E. 71 y 80
33. La fobia específica más frecuente en mujeres, es a:
- A. Los truenos
  - B. Los animales**
  - C. Los aviones
  - D. La oscuridad
  - E. La soledad
34. Rocío de 36 años, administradora, presentó desde hace tres años ánimo deprimido la mayor parte de los días de la semana, con sobrealimentación, insomnio, hipoergia, desesperanza, distractibilidad y dificultad para tomar decisiones. Este estado dura la mayor parte del día. Los días "buenos" nunca han sido más de dos semanas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Depresión atípica
  - B. Trastorno depresivo persistente**
  - C. Trastorno bipolar fase depresiva
  - D. Desregulación disruptiva del ánimo
  - E. Depresión breve recurrente
35. Mujer de 39 años, alcohólica, irritable, temerosa y desorientada; dejó de consumir alcohol una semana atrás. Durante la evaluación en urgencias gritó, muy asustada, que veía animales que subían por sus piernas y trató de retirarlos. El emergencista dispuso que sea sedada para tranquilizarla e iniciar la atención. ¿Cuál es el fármaco de elección?
- A. Haloperidol
  - B. Olanzapina
  - C. Tiamina
  - D. Valproato
  - E. Diazepam**

36. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio se encuentra con mayor probabilidad en el paciente autista?
- A. Disminución de dopamina sérica
  - B. Elevación de serotonina plaquetaria**
  - C. Disminución de dopamina en líquido céfaloraquídeo
  - D. Disminución de serotonina plaquetaria
  - E. Elevación de noradrenalina sérica
37. ¿Cuál es la estrategia o intervención que se centra en corregir las evaluaciones erróneas sobre las sensaciones corporales amenazantes?
- A. Técnicas de relajación
  - B. Desensibilización
  - C. Reestructuración cognitiva**
  - D. Interpretación
  - E. Exposición en vivo
38. ¿Cuál de los siguientes componentes de la marihuana es responsable de potenciales efectos terapéuticos?
- A. Tetrahidrocannabinol
  - B. Neuroesteroides
  - C. Eicosanoides
  - D. Cannabidiol**
  - E. Anandamida
39. Jorge de 32 años, en tratamiento regular por esquizofrenia desde hace 6 años, se quejó de problemas en su trabajo porque no podía retener los números de teléfono que le pedían que marque, pedidos o pequeños datos que le dictaban. ¿Cuál es el tipo de memoria afectada?
- A. Trabajo**
  - B. Semántica
  - C. Procedimental
  - D. Remota
  - E. Visual
40. ¿Cuál de las siguientes anomalías inmunológicas se presenta con mayor probabilidad en la esquizofrenia?
- A. Aumento del número de leucocitos periféricos
  - B. Hiporreactividad humoral contra células neuronales
  - C. Incremento de interleucina 3 en hipocampo
  - D. Anticuerpos dirigidos contra la hipófisis
  - E. Disminución de producción de interleucina 2 en linfocitos T**
41. La mayor frecuencia de una respuesta fisiológica bifásica ante la exposición al estímulo, con activación inicial y luego disminución de frecuencia cardíaca y presión arterial, que puede llevar al desmayo, se encuentra en la fobia a:
- A. La sangre**
  - B. Los insectos
  - C. Los rayos
  - D. El agua
  - E. Los perros
42. Beltrán de 34 años, comerciante, tuvo desde hace 6 años episodios múltiples y variables de síntomas hipomaniacos o depresivos, pero sin cumplir los criterios completos para ninguno de ellos. Los episodios duran alrededor de 5 semanas y le ocasionan malestar pues disminuyen su productividad, aumentan sus gastos, a veces toma decisiones apresuradas y su familia tiene conflictos con él. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Hebefrenia
  - B. Manía subclínica
  - C. Histrionismo
  - D. Ciclotimia**
  - E. Desinhibición
43. Mujer de 35 años, acudió a emergencia por cefalea "atroz, horrible, espantosa". Examen: maquillaje acentuado, adornos recargados, ropa ajustada y de colores muy brillantes, dramatismo y gesticulación viva durante su relato. Ante la presencia del cirujano, se arregla constantemente las prendas y trata de conseguir su teléfono. ¿Cuál es el trastorno de personalidad más probable?
- A. Histriónica**
  - B. Obsesiva
  - C. Límite
  - D. Paranoide
  - E. Dependiente

44. Niña de 6 años, cuyo lenguaje es monótono. Se dedica a dibujar y ordenar su colección de dinosaurios. Muestra incapacidad para interactuar con otros niños y fallas para entender el lenguaje no verbal. Olfatea todos los lápices de sus compañeros. Se angustia y llora si cambian la ruta de casa al colegio y viceversa. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Síndrome de Rett  
B. Esquizofrenia  
C. Obsesivo compulsivo  
D. Del espectro autista  
E. Mutismo selectivo
45. En el tratamiento del trastorno bipolar. ¿Cuál es la dosis promedio de carbamazepina en mg/día?
- A. 900  
B. 750  
C. 400  
D. 1200  
E. 1600
46. ¿Cuál es un importante diagnóstico diferencial del trastorno de la personalidad evitativa?
- A. Ansiedad social  
B. Personalidad esquizoide  
C. Paranoia  
D. Lesión frontal  
E. Personalidad viscosa
47. ¿Cómo se denomina la repetición mecánica de actividades discursivas o físicas?
- A. Manierismo  
B. Estereotipia  
C. Exaltación  
D. Disonía  
E. Pantomima
48. Según los datos sobre suicidio de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué países sobrellevan la mayor parte de la carga mundial (75%)?
- A. Altamente industrializados  
B. Con economía agrícola  
C. De ingresos bajos y medianos  
D. Del hemisferio norte  
E. Con informatización de datos
49. Luego de consumir marihuana hay incremento de apetito. ¿Cuál es el receptor responsable?
- A. 2-AG  
B. Vaniloide  
C. GABA  
D. D2  
E. CB1
50. Es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento, generalizado y poco flexible, estable en el tiempo, iniciado en la adolescencia o en la edad adulta temprana y que da lugar a malestar o deterioro, fuera de las expectativas culturales del sujeto. ¿A qué condición corresponde la definición?
- A. Aculturación  
B. Problema de adaptación  
C. Deterioro cognitivo  
D. Personalidad anancástica  
E. Trastorno de personalidad
51. Carla de 32 años, ingeniera muy apreciada en su entorno, se quejó de que los vecinos hablaban de ella y que los obreros de una constructora la querían secuestrar. Se encerró en casa; el esposo y los padres observaron que se dejó de bañar y cambiar de ropa, se agazapaba en el clóset y ponía música alta para que no la oyeran. A la evaluación clínica no hubo evidencia de traumatismo previo, consumo de sustancias ni otra patología. El episodio duró 6 días, con remisión de los síntomas y retorno al rendimiento previo, sin tratamiento. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Esquizofrenia paranoide  
B. Trastorno psicótico breve  
C. Trastorno delirante  
D. Depresión psicótica  
E. Episodio maniaco
52. Varón de 36 años, soltero, ingeniero de sistemas, trabaja a través de internet. Desde niño carecía de interés por actividades grupales. En la universidad era cortés pero retraído e indiferente ante las actividades sociales, con solo uno o dos amigos. No ha tenido parejas. Rehúsa empleos que requieren trabajo presencial en equipo. No le interesa la compañía de las personas. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Bipolar mixto  
B. Personalidad esquizoide  
C. Obsesivo compulsivo  
D. Esquizofrenia simple  
E. Síndrome frontal

53. Mujer de 26 años, que fue llevada a emergencia desde una discoteca; se escondió debajo de una cama diciendo que los policías iban a arrestarla y que "los narcos" la seguían para matarla. Al ingreso se constató angustia, tembor, palidez de piel y mucosas, pupilas mióticas, T°: 36.5 °C, FC: 120X' y PA: 170/120 mmHg. Durante la evaluación presentó convulsiones. El emergencista pidió el dosaje de metabolitos de una sustancia en sangre para confirmar su sospecha. ¿Cuál es la sustancia más probable?
- A. Metadona  
B. Marihuana  
C. Alcohol  
D. Tramadol  
E. Cocaína
54. Hombre de 31 años, conducido a emergencia por la policía por haber amenazado con arrojar piedras a los transeúntes. Llegó vociferando insultos y amenazas, levantando los puños y golpeando el suelo con los pies. Esta conducta se incrementó a los pocos minutos. Al pedirle el personal que se eche en la camilla, agitó contra ellos su zapato. El personal se prepara a reducirlo porque el paciente muestra signos de...
- A. autoagresión.  
B. peligro de fuga.  
C. intoxicación.  
D. esquizofrenia.  
E. agresión inminente.
55. Rita de 28 años, en tratamiento por esquizofrenia, es muy disciplinada con su medicación, dieta y ejercicio. Ha tenido antecedentes de hiperprolactinemia y efectos secundarios extrapiramidales con algunos antipsicóticos. Durante su revisión clínica anual se quejó de insomnio y su EKG mostró un alargamiento del intervalo QT. Su psiquiatra decide cambiar de antipsicótico. ¿Cuál es la elección más probable?
- A. Haloperidol  
B. Quetiapina  
C. Ziprasidona  
D. Clozapina  
E. Risperidona
56. Mujer de 16 años que fue conducida a la fuerza por familiares a emergencia. Antecedentes: menarquia a los 13 años, amenorrea desde hace 8 meses. Examen: hostil, muy adelgazada, con lanugo, piel y cabello secos. PA 100/60 mmHg. Laboratorio: Hb 7.2g/dl, alcalosis moderada e hipokalemia severa. Con esos datos, ¿Qué trastorno potencialmente fatal puede presentarse?
- A. Hipotensión  
B. Arritmia  
C. Anemia  
D. Deshidratación  
E. Autolesión
57. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un episodio maniaco y uno hipomaniaco?
- A. Presión del habla  
B. Gastos excesivos  
C. Síntomas psicóticos  
D. Insomnio  
E. Irritabilidad
58. Mujer de 60 años, que presentó desde hace cuatro meses pérdida del interés en sus actividades diarias, anhedonia, hiporexia, insomnio, edema duro y obesidad central. ¿Cuál de los siguientes exámenes auxiliares debe solicitarse como apoyo al diagnóstico?
- A. TGO, TGP.  
B. Electroencefalograma  
C. Dosaje de plomo sérico  
D. T4 y TSH  
E. Test de ADA sérico
59. Varón de 29 años que acude a emergencia muy ansioso, quejándose de dolor abdominal severo, episódico, aparentemente iniciado luego de una cirugía hace un año, que alivia con "analgésico" que solicita. Se queja de dolor en piernas y náuseas. Examen: diaforético, rinorreico, pupilas midriáticas. PA 160/110 mmHg, FC 110X', T° 38.5°C. Durante la evaluación presentó vómitos. Un técnico lo reconoció y avisó que el paciente frecuentaba la emergencia por el mismo problema en otro hospital. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Abstinencia a opiáceos  
B. Trastorno por dolor  
C. Trastorno conversivo  
D. Simulación  
E. Crisis de porfiria
60. ¿De cuántas personas consta, como mínimo, el equipo para reducir a un paciente violento?
- A. 5  
B. 3  
C. 6  
D. 2  
E. 9

61. Una paciente, adicta al clonazepam, lo combinó con alcohol y usó el triple de su dosis usual para dormir. Es conducida a emergencia por sopor profundo. Examen: no responde a estímulo doloroso, FR 12X', resto no contributorio. ¿Qué medicamento se administrará con mayor probabilidad?
- A. Flumazenilo  
B. Diazepam  
C. Carbamazepina  
D. Dimenhidrinato  
E. Ranitidina
62. ¿Cuál de los siguientes antipsicóticos produce sedación intensa?
- A. Clorpromazina  
B. Flufenazina  
C. Haloperidol  
D. Trifluoperazina  
E. Perfenazina
63. Carlos de 32 años, residente de III año, se preocupó desde estudiante por detalles, normas, listas, orden u organización. Hace lo mismo en el pabellón pero descuida aspectos importantes, no expone a tiempo por hacer una presentación "perfecta", pasa casi todo el día en el hospital y se pierde las actividades de ocio con la familia, colegas y amigos. Percibe que tiene que dar informes detallados al jefe del pabellón y presiona a los residentes e internos para lograr "altos estándares de calidad". ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Trastorno de ansiedad generalizada  
B. Rasgos limítrofes de personalidad  
C. Bipolar II fase maniaca  
D. Personalidad obsesivo compulsiva  
E. Fase anal de Freud
64. ¿En qué situación un pensamiento que nunca se tuvo se percibe incorrectamente como repetición de un pensamiento anterior?
- A. Déjà pensé  
B. Confabulación  
C. Parafasia  
D. Déjà entendu  
E. Obsesión
65. ¿Cuál de los siguientes fármacos se usa con mayor frecuencia para el tratamiento del síndrome neuroléptico maligno?
- A. Clonazepam  
B. Quetiapina  
C. Vitamina E  
D. Orfenadrina  
E. Bromocriptina
66. Estudios recientes muestran evidencia de la neurogénesis en el cerebro adulto. ¿En qué zona cerebral se lleva a cabo este proceso?
- A. Corteza prefrontal  
B. Hipocampo  
C. Cuerpo calloso  
D. Hipotálamo  
E. Corteza parietal
67. En los varones. ¿Cuál es la fobia específica que se presenta con mayor frecuencia?
- A. Cinofobia  
B. Ailurofobia  
C. Misofobia  
D. Acrofobia  
E. Nictofobia
68. Un paciente alcohólico, sobrio en la entrevista, admitió que se siente muy enojado porque desde hace dos meses perdió el control de su consumo de alcohol. Esto empeoró durante las dos últimas semanas. Se sintió atrapado por su trastorno, su familia y sus deudas, por lo que se aisló de familiares y amigos. Tuvo momentos de gran angustia que intentó manejar con más alcohol porque "si no lo hago, puedo hacerme una barbaridad, algo muy malo". Según la entrevista. ¿Qué riesgo correría con mayor probabilidad?
- A. Intoxicación  
B. Autoagresión  
C. Suicida  
D. Acatisia  
E. Escape

69. Ingeniero de sistemas de 67 años. Desde hace tres años experimentó fallas en la memoria reciente, olvido de llaves y dinero y requirió ayuda para hacer documentos. Desde hace dos años la esposa lo ayuda a escoger su ropa diaria y recordar su alimentación. No tiene antecedentes de importancia. La exploración física y los exámenes auxiliares no son contributivos. El hermano mayor tuvo un trastorno similar. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Depresión crónica  
B. Hematoma subdural  
C. Discapacidad intelectual moderada  
D. Delirium subagudo  
E. Neurocognitivo mayor
70. ¿Cuál es la principal causa de muerte prematura en las personas con esquizofrenia?
- A. Infarto  
B. Arritmia  
C. Hepatopatía  
D. Cáncer  
E. Suicidio
71. Varón de 24 años, evaluado en medicina interna, neumología y cardiología. Tiene más de 6 episodios en dos meses de dolor precordial, taquicardia, sudoración, sensación de falta de aire, vértigo y parestesias, que duran alrededor de 30 minutos; no presenta alteración del examen físico ni en los exámenes auxiliares. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Hipocondría  
B. Fobia  
C. Agorafobia  
D. Pánico  
E. Compulsión
72. Sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). ¿Cuál es el neurotransmisor más estudiado?
- A. Serotonina  
B. Histamina  
C. GABA  
D. Dopamina  
E. Neurotensina
73. ¿Cuál es el marcador de progresión más rápida de trastorno cognitivo leve con amnesia hacia enfermedad de Alzheimer?
- A. Hipoproteinemia tau  
B. Amiloidosis A $\beta$ <sub>62</sub>  
C. Apolipoproteína E4  
D. Apolipoproteína 10  
E. Progerelina
74. ¿Cuál es un mecanismo de defensa maduro de la personalidad?
- A. Temor  
B. Sublimación  
C. Aislamiento  
D. Disociación  
E. Desrealización
75. María está en el velorio de su madre, a la cual siempre ha tratado y cuidado con cariño. Los familiares se alarman cuando la ven reír y bromear al lado del ataúd. Esta actitud persiste aún cuando le llaman la atención por la conducta. ¿Cuál es la anomalía del afecto?
- A. Restringido  
B. Delusivo  
C. Inadecuado  
D. Agitado  
E. Aplanado
76. Varón de 36 años, en tratamiento por trastorno bipolar, que ingresó a emergencia por náuseas y vómitos, fasciculaciones, visión borrosa y estupor. Examen: reflejos osteotendinosos hiperactivos. Durante la observación presentó convulsiones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Supresión de carbamazepina  
B. Intoxicación por haloperidol  
C. Intoxicación por litio  
D. Supresión de clonazepam  
E. Intoxicación por valproato
77. La debilitación de una respuesta condicionada por eliminación del reforzador, corresponde al concepto de:
- A. Saturación  
B. Denigración  
C. Reducción  
D. Extinción  
E. Inoculación

78. Mujer de 45 años, empresaria, muy activa, cordial y habladora, que acompaña a la consulta psiquiátrica a su hijo con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ese día estaba angustiada, sudorosa, apagada y subida de peso. Al revisar la historia, el psiquiatra advirtió que el niño lucía mejor, pero que la madre afirmaba en varias consultas que requería mayores dosis de metilfenidato y había solicitado a otros colegas recetas adicionales por extravío. Cuando el psiquiatra prescribió una cantidad ligeramente menor, la madre se mostró angustiada e irritada y afirmó que el psiquiatra quería atentar contra su tranquilidad y la de su hijo. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica más probable en la madre?
- A. Paranoia  
B. Abuso de marihuana  
C. Hiperactividad  
D. Adicción a metilfenidato  
E. Personalidad inestable
79. Mujer de 79 años, maestra retirada, activa intelectual y socialmente, que usa suplementos nutricionales. Durante el presente mes inició tratamiento farmacológico por ansiedad moderada, lumbalgia y estreñimiento ocasionales. Una noche, los familiares la vieron asustada "por los hombres que se han metido a la casa" mientras usaba un palo para alejarlos. En emergencia suprimieron uno de los fármacos prescritos. ¿Cuál es el medicamento con mayor probabilidad de ser retirado?
- A. Escitalopram  
B. Paracetamol  
C. Bisacodilo  
D. Vitamina B12  
E. Alprazolam
80. Sonia de 48 años, hipertensa, ha experimentado desde los 15 años episodios cíclicos de cambios de humor, sensibilidad al rechazo, irritabilidad, aumento de conflictos, sensación de desesperanza, letargo y anhelo de consumir bocaditos muy salados. Estos se inician una semana antes de la menstruación y desaparece una semana después de ésta. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Depresivo recurrente  
B. Disfórico premenstrual  
C. Asociativo hormonal  
D. Personalidad doble  
E. Bipolar I
81. En la terapia de los trastornos de ansiedad. ¿Cuál es una de las estrategias para la resolución de problemas?
- A. Generar soluciones alternativas  
B. Preguntar a múltiples consejeros  
C. No evaluar los ensayos de soluciones  
D. Evitar las situaciones de ansiedad  
E. Ignorar los consejos
82. Varón de 35 años, felizmente casado, en tratamiento exitoso de depresión con sertralina, sin otro antecedente médico; refirió que tiene deseo sexual hipoactivo. ¿Qué fármaco mejorará esta situación?
- A. Venlafaxina  
B. Paroxetina  
C. Haloperidol  
D. Atomoxetina  
E. Bupropión
83. ¿Cuál de los siguientes trastornos de personalidad puede realizar con mayor frecuencia autoagresiones sin finalidad suicida ante situaciones de estrés?
- A. Antisocial  
B. Evitante  
C. Límite  
D. Paranoide  
E. Anancástico
84. ¿Cuál es la técnica más cercana en éxito a la exposición in vivo en el tratamiento de las fobias?
- A. Exposición imaginal  
B. Desensibilización  
C. Videoterapia  
D. Realidad virtual  
E. Terapia racional
85. ¿Cuál es el trastorno de la personalidad diagnosticado con más frecuencia en las mujeres con síndrome del cromosoma X frágil?
- A. Esquizotípica  
B. Evitante  
C. Inestable  
D. Anancástica  
E. Paranoide

86. ¿Cuál es la acción farmacológica de la memantina?
- A. Antagonista opioide
  - B. Agonista NMDA
  - C. Efecto muscarínico
  - D. Antagonista NMDA
  - E. Agonista dopaminérgico
87. Mujer de 27 años, ama de casa, que ha sido abandonada hace una semana por el padre de sus tres hijos. Ingresó a emergencia por haber ingerido cuatro tabletas de diazepam, diez de paracetamol y ocho de amoxicilina. Durante la evaluación, afirmó: "tomé un montón de medicinas para morirme y fallé... soy un fracaso de mujer... que mi esposo se haga cargo de mis hijos... así lo dejé escrito, porque yo no puedo hacerlo". Se encontró una nota en la casa donde legaba sus pocos bienes a su madre. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Gesto suicida
  - B. Manipulación
  - C. Intoxicación aguda
  - D. Autolesión
  - E. Tentativa de suicidio
88. Varón de 76 años, con agitación luego de cobertura de ojos posterior a cirugía de catarata. Mejoró sin medicación al retirar la cobertura de ojos. ¿Cuál fue la causa más probable de la agitación?
- A. Dolor retroocular
  - B. Demencia
  - C. Hipoglicemia
  - D. Aislamiento
  - E. Hipoestimulación visual
89. ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente del consumo de dietilamida del ácido lisérgico (LSD)?
- A. Mal viaje
  - B. Síncope
  - C. Muerte
  - D. Infarto
  - E. Vómitos
90. ¿Cuál es una alteración cognitiva presente en los trastornos de personalidad?
- A. Respuesta emocional elevada
  - B. Flexibilidad conductual
  - C. Pobre relación interpersonal
  - D. Interpretación de actos propios y ajenos
  - E. Fracaso en control de impulsos
91. Varón de 45 años, se quejó de depresión. Durante el interrogatorio manifiesta: "No tengo amigos... he tenido muchos trabajos diferentes porque duro poco tiempo en ellos... renuncio, porque mis compañeros terminan traicionándome... también mis padres y mi familia... no se puede confiar en nadie, porque siempre van a tratar de dañarte si bajas la guardia. Por eso, nunca olvido un insulto o desaire". ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Personalidad paranoide
  - B. Esquizofrenia residual
  - C. Trastorno antisocial
  - D. Pocas habilidades sociales
  - E. Retardo mental
92. Varón de 21 años, expulsado de la universidad tras acusaciones comprobadas de sus compañeros, a quienes engañó pidiendo dinero supuestamente para solventar gastos por enfermedad de su madre, robó pertenencias y agredió ante los reclamos de los agraviados. Cuando encontraban objetos robados en su mochila, negaba el hurto o decía: "estabas pidiendo que te lo quiten". ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Cinismo
  - B. Autismo de Kanner
  - C. Personalidad antisocial
  - D. Bipolar tipo I
  - E. Esquizofrenia simple
93. En el trastorno de ansiedad generalizada, ¿Cuál es la característica clínica más frecuente?
- A. Búsqueda de múltiples consejos
  - B. Mayor atención a información amenazante
  - C. Seguir confiadamente la primera indicación médica
  - D. Subestimar la posibilidad de sucesos negativos
  - E. Desatención a la salud física e higiene
94. ¿Sobre qué tipo de receptores actúa de preferencia la cafeína?
- A. Cannabinoides
  - B. Adenosina
  - C. Noradrenérgico
  - D. Gabaérgicos
  - E. Histaminérgicos

95. En un usuario de clozapina, ¿Cuál de los siguientes fármacos aumenta el riesgo de producir agranulocitosis?
- A. Diazepam
  - B. Litio
  - C. Aspirina
  - D. Penicilina
  - E. Carbamazepina
96. ¿Cuál de las siguientes sustancias está relacionada con la presencia del síndrome amotivacional?
- A. Marihuana
  - B. Cocaína
  - C. Psilocibina
  - D. Ketamina
  - E. Fenciclidina
97. Mujer de 14 años, mayor de 5 hermanos, que desde hace 6 meses cambió de colegio y bajó su rendimiento escolar. Su madre notó que siempre usaba una vincha gruesa para tapar zonas de alopecia cerca a la frente. La paciente confesó que se arranca el cabello de forma recurrente y no puede controlarse. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Tricotilomanía
  - B. Dismorfofobia
  - C. Tic facial
  - D. Ansiedad generalizada
  - E. Fobia social
98. ¿Cuál es la forma de esquizofrenia que se caracteriza por un comportamiento inadecuado, manierismos, afecto inapropiado y delusiones o alucinaciones transitorias y no sistematizadas?
- A. Hebefrénica
  - B. Paranoide
  - C. Anancástica
  - D. Organizada
  - E. Catatónica
99. Varón de 30 años, con antecedentes de esquizofrenia y abandono de tratamiento, es conducido a la emergencia por gritar en la calle. Luego de la evaluación, el psiquiatra advirtió al equipo que había riesgo de heteroagresión, porque el paciente había manifestado que...
- A. no usó sus medicinas por tres meses.
  - B. escuchaba que murmuraban a su alrededor.
  - C. creía que había descubierto una conspiración.
  - D. oía voces que le ordenaban golpear a personas.
  - E. era seguido por los terroristas musulmanes.
100. Niño de 5 años, con repetición de sonidos y sílabas, prolongación del sonido de consonantes y vocales, circunloquios, bloqueos y repetición de palabras monosilábicas. No hay otras alteraciones. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. De la fluidez del habla
  - B. Déficit sensitivo
  - C. De la comunicación social
  - D. Del espectro autista
  - E. Discapacidad intelectual leve